

inter carneam membranam & cutem repens, sobolesq; tenuissimas diffundens. Huic furculo pollicis exporrecto interdum ramuli accedunt, permiscunturq; ab ijs secundi nervi propaginibus, quas modò internæ summæ manus cutem adire scribam. ^{h. 2. fig. 1. ult.} Humilior enim crassiorq; ramus eius secundi nervi diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in duas quoque dirimitur propagines, sub¹ mediâ prorepentes uena ab humerali ad communis uenæ constitutio nem proficiscente. ^{h. 2. fig. 2. ult.} Vna harum propaginum quam elatiorem appellare nihil prohibet, postquam dictæ iam uenæ succumbens, ad² uenæ communis usque originem obliquo ductu accessit, relicta uena cuti subtenditur, & in descensu elatius ad radij sedem nonnihil oblique con ascendens, secundum internum latus³ musculi oblongi & radio proprij ad brachialis usque radicem perfertur. ^{h. 2. fig. 3. ult.} Altera propago, quam memoriæ doctrinæq; gratia in scholis humiliorem nuncupo, magis oblique quàm medium cubiti flexus aut uenæ communis origo consistat, deorsum fertur, ac tandem uenæ maioris cubiti sedis cuti potissimum oblatae attensa, ad brachiale usque⁴ prorepat, in multos exiles furculos in progressu absumpta. Nam priusquam longo ductu in cubiti regionem feratur, in duos præcipuos partitur ramos, quorum⁵ unus quodammodo radij regioni exporrigitur, alter uerò ulnæ, ac uterque crebrò brachiale superat, ramulos in cutem internæ summæ manus sedi dispargens. Dein ab illis ramulis qui Veneris monticulum conscendunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrunt, nervulis⁶ commiscendæ cutem primi pollicis internodij externæ regioni obductam implicantibus, atque in hunc modum secundus absumitur nervus. Tercius autem nervus simulatque secundi nervi⁷ propagine adaugetur, frequenter⁸ ramulum in cutem dispensat, anteriori brachij sedi hic obnatam. Hinc uti ab initio in alto repositus, cubiti flexum accedit, æquali propemodū intervallo in progressu à secundo distans, ac internam sedem sibi uendicans. Tercius enim nervus nō ad amul sim per mediâ cubiti flexus sedem in cubitum delabitur: uerum anteriori sedi insidet⁹ tuberculi interioris humeri, ac super internum latus quodammodo uehitur insertionis¹⁰ musculi cubiti flexuentium posterioris. Quum uerò hanc transcendit insertionem, in multas¹¹ dirimitur propagines, seriatim tunc recensendas, ubi¹² quintum nervum ad cubitum usque sermonis serie deduxero, qui unâ cum tertio in musculos digeritur, sedem cubiti internam occupantes. ^{h. 2. fig. 4. ult.} Quartus nervus à reticulari illo neruorum iuxta uertebrae latera implexu principium quo que ducens, omnium neruorum qui in brachium porriguntur longè crassissimus est, & similiter atq; tertius occultatus cum ipso in brachium properat, axillari uenæ & magnæ manus arteriæ attensus, moxq; insignes utunque soboles¹³ musculis distribuens, quorum ministerio cubitum extendimus. Priusquam uerò præsens nervus ad mediū usque longitudinis brachij per tingat, oblique retrorsum¹⁴ ad humeri os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercedens. Verum anteaq; penitus reflectatur, ab interno ipsius latere¹⁵ propaginem emittit, quæ¹⁶ inter musculos cubitum extendentes & posteriorem cubitum flexuentium in internam brachij sedem prociat, uniuersa in huius sedis cutem absumenda, furculosq; partim sursum partim deorsum multiplici serie sparsura. Porro ipse quarti nervi truncus, ad eum modum secundum humeri posteriorem reflexus, sensim ad externâ brachij sedem properat, ac ab externo latere¹⁷ propaginem edit, quæ¹⁸ inter exteriorem cubitum extendentium musculum & caput oblongi musculi radium in proutum ducentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachij & cubiti articuli sedi obductam. Quum primum autem quartus nervus in alto semper latitans, ^{h. 2. fig. 5. ult.} exterius humeri contingit tuberculum, posteriori ipsius sedi innititur, in qua huius nervi nomine¹⁹ sinum à Natura priuatim exculptum diximus, quò nervus musculis occulta tus, atque hic in frequentem sobolem spargendus, turò ueheretur. Mox enim atque nervus ille in cubitum ducitur, ^{h. 2. fig. 6. ult.} ramum promit, qui ex alto emergens, errabundo ductu sub cute ad brachiale usque prorepat, frequentes furculos in progressu educens, à quibus cutis externam cubiti sedem obtegens intertextitur. Deinde quartus nervus in duos²⁰ descenditur truncos, in profundo, ut & ipsorum radix, reconditos. Horum²¹ alter altero elatior est, ac radio exporrigitur: alter autem qui humilior consistit, secundum ulnam deorsum fertur. Elatior penitus in ter superius latus musculi bifido tendine brachiale extendentis, & exterius inferius uel latus musculi longi radium in proutum ducentis ad brachiale contendit, in progressu graciles ramulos utrisq; quibus attenditur occultaturq; musculis cōmunicans. Vbi uerò elatior hic ramus brachiale accedit, per²² transuersum properat ligamentum, in externa radij sede bifido tendine brachiale extendenti obductum. Cæterum mox atque præsens quarti nervi ramus externam brachialis sedem²³ cōtingit, in duas dirimitur propagines, quarum altera duplici furculo externæ pollicis regioni offertur, altera uerò in duas secta soboles, unam indici porrigit in ipsius externam sedem duplici quoque furculo absumendam. alteram autem medio largitur digito, cam simpli

Tercij nervi
ad cubitum usque
flexum pro
gressus.

Quartij nervi
in brachium
ingressus, ip
siusq; series.

simplicem indiuisamq; interno lateri exterioris sedis eius digiti applicans. ^{h. 2. fig. 7. ult.} quarti nervi iam cubitum ingredientis in duos ramos²⁴ sectionis, qui ulnæ frequentes educit soboles, ac primam donat capiti²⁵ musculi indicem, m extendentis, secundam capiti²⁶ musculi cuius auxilio minimus extenditur digi offert²⁷ musculo brachiale simplici tendine extendenti. In ipso autem secundu præsens ramus²⁸ tribus musculorum principijs ab ulna originē ducentibu bet, ac eorum quidem principiorum primus musculus est, qui radium in p breuior uisitur: mox ille qui triplicem diffundit tendinem, ac unum brachia lis os sustinenti innectit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo tio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus, pollicem extenden ducit. Mox musculus, cuius beneficio index, ac interdum quoque medius a oblique aguntur. Horum nanque musculorum principijs seriatim ab ulna præsentis quarti nervi ramo soboles offeruntur, accurate fibrarum eorum mu obseruantes, qui oblique ab ulna uersus radium pertinet. Quod uerò huius brachiale non conscendit, multoq; minus in minores absumitur digitos, ad brachialis radicem cessat, aliquot furculis brachialis cum cubito articuli i sanè modum quartus nervus in ramos spargitur. Porro²⁹ quintus nervus a sepius nobis plexu inferius quàm quatuor hactenus descripti, principij nam attensus per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam b uens. Nam indiuisus³⁰ inter musculos cubitum extendentiū interiore, & c posteriorem secundum internâ brachij sedem occultatus tantisper porrigitur humeri contingat tuberculum, ad cuius posteriorem reflectitur sedem, hie sinum, quo aptè in cubitū uehitur. Quemadmodum enim tertius nervus a tuberculi sedi occupare dictus est, ita sanè & quintus hic nervus in posterior li consistit, pariq; quodammodo serie cum tertio digeritur. A duobus nanq; tis³¹ propagines omnibus offeruntur musculis internam cubiti sedem occup interiori tuberculo humeri, & ab ipsa ulna radij principium mutuatur. A neruo potissimum soboles sparguntur in³² musculum flexit articulos, mo flexentem, & illi qui tertios eorundem digitorum secundos quatuor digi pollicis ossis flexus est autor. deinde propago quoque à tertio nervo³³ illi po qui ab interno humeri prodians tuberculo, ac postbrachialis ossi indicē susti chialis flexus opifex habetur. Verum is musculus etiam à quinto nervo furcu scit, ut & omnes ab interno humeri tuberculo pronati, ex quorum classe præ moratum³⁴ is censetur, qui tēdine lato summæ manus internæ cuti subnascit to brachialis ossi insertus brachiale flexit, mox³⁵ qui radium in supinum duc describitur. Porro quintus & tertius nervi etiam si sparsam hanc propaginem penitus hic non absumuntur, uerum utrorumque singuli adhuc superflunt ra & in plures furculos diffundendi. Ac tertij quidem nervi³⁶ ramus inter muscu gitorum secundos flexentem articulos, & illum qui tertium pollicis os flexit tur, unâ cum³⁷ uena ac arteria hac deductis ad brachiale properans, & trans ligamentum in brachialis interna sede tendinibus obductum. Iste tertij nerui sed nimis quàm obscuros, quibusdā musculis exhibere dicitur: qui in extren digitorum motibus quoque præfunt, cuiusmodi³⁸ is est quo pollex ab indice tur, dein³⁹ quo pollex indici proximè adigitur, & duo pollicis primū flexent tres secundi ipsius internodij flexus opifices, mox⁴⁰ qui indicem ac medium p ac⁴¹ duo qui indicis primum flexunt articulum, ac interior denique primū flexentium. Verum his musculis, ut & illi qui radium in supinum ducenti uipotius attenduntur, quàm inserantur, aut etiam superficietenus adnasci tertij nervi ramus in uola tres notatu dignas & insignes quoque emittit prop prima pollicis internam accedit sedem, in duos prius dissecta furculos: secund culis internæ indicis sedi implicatur, tertia uerò simplex interno tantum lateri digiti sedis exporrigitur. Porro quinti nervi⁴² ramus ulnæ attensus inter mul quatuor digitorum articulos flexentem, & illum qui eorundem digitorum flexit, ad brachiale ducitur, uena etiam & arteria cōcomitatus, quæ ulnæ exp ad uolam per transuersum brachialis ligamentū tendunt. Hic ramus simulat id superauit, unam propaginē in duos diuisam furculos minimi digiti internæ ac unam similiter in duos furculos diremptam internæ sedi anularis digiti of